


**ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ**
**Вінницького національно
аграрного університету**

**Серія: Сільськогосподарські
науки**



Випуск 1(71)

2013

Збірник наукових праць
Вінницького національного аграрного університету
Серія: Сільськогосподарські науки
Випуск 1 (71)

Видається за рішенням Вченої ради Вінницького національного аграрного університету
(Протокол № 5 від 24 листопада 2013 року).

Журнал реєстровано пресою "ДАК України" від 11 вересня 1997 року як наукове видання з публікацією результатів дисертаційних та кандидатських дисертацій.

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва сільськогосподарської продукції та технології виробництва і переробки продукції рослинництва і тваринництва та ін.

Збірник розрізняється на наукових співробітників, викладачів вузів, аспірантів, студентів та фахівців сільськогосподарського виробництва.

*Свідоцтво про державну реєстрацію прокомісією засобу масової інформації
КВ 16644-5116 ПР від 30.04.2010*

Редакційна колегія:

Балетнік Григорій Миколайович, д. с. н., проф., ВНАУ (головний редактор);
Яремчук Олександр Степанович, к. с.-гн., професор, ВНАУ (заступники головного редактора);
Бережнюк Наталя Анатоліївна, к. с.-гн., доцент, ВНАУ (відповідальний секретар);

Члени редколегії:

Власенко Володимир Васильович, д. б. н., професор, ВНАУ;
Гусєт Анатолій Васильович, д. с.-гн., ВНАУ;
Кочин Іван Іванович, д. с.-гн., професор, Московська державна академія ветеринарної медицини і біотехнології ім. Святослава;

Кулик Михайл Федорович, д. с.-гн., професор, член-кореспондент НААНУ, ВНАУ;

Кучерявий Віталій Петрович, д. с.-гн., ВНАУ;

Лисенко Олександр Паклович, д. вет. н., професор, НДІ експериментальної ветеринарії АН Білорусії (м. Мінськ);

Мазуреню Микола Олександрович, д. с.-г. н., професор, ВНАУ;

Польовий Леонід Васильович, д. с.-г. н., професор, ВНАУ;

Скоромна Оксана Іванівна, к. с.-гн., доцент, ВНАУ;

Чудак Роман Андрійович, д. с.-г. н., професор, ВНАУ;

Шейко Іван Павлович, д. с.-г. н., професор, НДІ тваринництва АН Білорусії (м. Жодіно).

Царук Л.Л., Бережнік Н.А. ПОРІВНЯЛЬНА СЛІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ІНКУБАЦІЙНИХ ЯЄЦЬ КАЧОК	62
<i>Безпека продуктів харчування та технологія переробки</i>	
Бурлака Н.І., Романенко Т.Д. СТРATEGІЧНИЙ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ	69
Марценюк Н.О. СЛІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РИБНИХ ГОСПОДАРСТВ ВІННИЧЧИНИ	77
Новаленко Н.О., Поліщук О., Вишневська О. СУЧАСНІ ПОНЯТТЯ ПРО ЯКІСТЬ МОЛОКА	82
Новаленко Н.О., Разікова К., Шкатула І. ВПЛИВ ЧИННИКІВ НА ВМІСТ БІЛКА В МОЛОЦІ	88
Панько В.В., Ковал'чук О.Б., Рудківська Л.О. АНАЛІЗ СИРОВИННОЇ ЗОНИ ДЛЯ ІСНУВАННЯ СУЧАСНОГО «ЖИТОМИРСЬКОГО МАСЛОЗАВОДУ»	92
Панько В.В., Переродова Р.В., Ложкіна І.В. ВМІСТ РАДІОНУКЛІДІВ В КОРМОВИХ КУЛЬТУРАХ В ГОСПОДАРСТВАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЗОНИ ЗАБРУДНЕННЯ	100
Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. РОЗВИТОК БДЖОЛИНИХ СІМЕЙ ЗА ВИРОБНИЦТВА БДЖОЛИНОГО ОБНІЖЖЯ ТА ПЕРГИ	108
Разанов С.Ф., Швець В.В., Марчак Т.В. ВПЛИВ ВАЛНУВАННЯ ГРУНТІВ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ Zn і Cu У БДЖОЛИНОМУ ОБНІЖЖІ ТА ПЕРЗІ	112
Разанов С.Ф. ВПЛИВ КІЛЬКОСТІ ВИВЕДЕНИХ ГЕНЕРАЦІЙ БДЖІЛ У СТІЛЬНИКАХ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У МЕДІ	116
Возіян В.В., Любич В.В., Сухомуд О.Г. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА СОРТИВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ РІЗНОГО ЕКОЛОГО-ГЕОГАФІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ	121
Власенко В.В., Новгородська Н.В., Крижак Л.М., Гусак Є.А., Власенко І.Г. НОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕКОЮ МОЛОКА- СИРОВИНИ	126
Галух Б.І., Драчук У.Р., Дроник Г.В., Фаріонік Т.В. СМАКО-АРОМАТИЧНІ РЕЧОВИНИ ЕРИНЗИ ВИГОТОВЛЕНОЇ З МОЛОКА РІЗНИХ ВІДІВ ТВАРИН	130
Калайда К.В. БІОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФІТЮРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛОДІВ АКТИНІДІЇ	136

УДК 631.4:631.821[546.47+546.56]638.178.2

Разанов С.Ф., доктор сільськогосподарських наук

Швець В.В., пошукувач

Марчак Т.В., кандидат хімічних наук, доцент
Вінницький національний аграрний університет

ВПЛИВ ВАПНУВАННЯ ГРУНТІВ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ Zn і Cu У БДЖОЛИНОМУ ОБНІЖЖІ ТА ПЕРЗІ

Встановлено зниження концентрації Zn і Cu у вегетативній масі гречки та продуктах переробки її квіткового пилку (обніжжі та перзі) за вапнування кислих ґрунтів.

Техногенна діяльність населення привела до забруднення важкими металами медоносних угідь, нектар і квітковий пилок рослинності яких є сировиною для виробництва продуктів бджільництва. За таких умов спостерігається певне накопичення в продуктах бджільництва важких металів, що знижує їх якість.

Встановлено, що продукція бджільництва, в тому числі і бджолине обніжжя та перга, мають широкий спектр використання в харчуванні населення та медичній практиці із-за високопоживних та лікувальних властивостей. Водночас, необхідно відмітити і підвищення вимог до якості цієї продукції. Відомо, що якість продукції бджільництва залежить від рівня забруднення ґрунтів шкідливими речовинами. На даний час серед шкідливих речовин особливу небезпеку представляють важкі метали.

Відомо, що важкі метали мають властивість біогенного накопичення та високу міграцію в системі ґрунт—рослина. Інтенсивність міграції важких металів в системі ґрунт → продукція рослинництва залежить від цілого ряду факторів, а саме, і від типу ґрунтів, біологічних особливостей рослин, кількості ґрутового розчину, кислотності ґрунтів та ін. [1].

Аналіз літературних джерел показує, що на даний час недостатньо вивчено вплив кислотності ґрунтів на концентрацію важких металів у бджолиному обніжжі та перзі.

Метою досліджень було встановлення рівня концентрації важких металів у вегетативній масі гречки, бджолиному обніжжі та перзі за вапнування кислих ґрунтів.

Матеріали та методи. Дослідження проводили в умовах центрального Лісостепу на території Вінниччини. Матеріалом для дослідження були вегетативна маса гречки (стебло), бджолине обніжжя та перга, вироблені бджолами з квіткового пилку цієї культури. Дослідний матеріал заготовляли з гречки, висіяної на двох полях (№1 і №2), pH яких був в межах 4,7-4,9. В ґрунт поля №2 було внесено вапно з розрахунку 6 т/га.

Під час цвітіння гречки проводили відбір дослідного матеріалу окремо з кожного поля. Відбір ґрунту проводили методом конверту, вегетативну масу – способом точкових проб, описаним Б.С. Прістером [5]. Формування бджолиних сімей проводився за методом груп-аналогів [3]. Заготівлю бджолиного обніжжя способом, описаним В.П. Поліщуком [4], а перги - О.Д. Комісаром [2]. Визначення рухомих форм важких металів у бджолиному обніжжі проводили атомно-абсорбційним методом на приладі AAS-200 у агрочімічній лабораторії Вінницького НАУ.

Результати досліджень та їх обговорення. Міграція важких металів у системі

грунт→рослини призводить до накопичення цих речовин в квітковому пилку, який є сировиною для вироблення бджолиного обніжжя і перги. Тому, можна припустити про певне накопичення Zn і Cu в цій продукції.

Одержані результати досліджень показують, що продукти переробки бджолами квіткового пилку гречки (бджолине обніжжя та перга) містять певну кількість Zn і Cu. Порівнюючи концентрацію Zn в бджолиному обніжжі, одержаному з контролного поля, де pH ґрунту складав 4,7 з допустимими рівнями (ДСТУ 3127-95) (табл.), необхідно відмітити перевищення цього показника в 1,1 рази. Тоді як концентрація Cu знаходилась в межах допустимих рівнів. У перші концентрація Zn і Cu була вища за допустимі рівні відповідно у 3,3 рази і у 1,94 рази.

За вапнування ґрунту, що знизило його кислотність до 7,4, концентрація Zn і Cu була нижча за ГДК відповідно у бджолиному обніжжі у 1,2 та у 2 рази. У перші спостерігається перевищення концентрації Zn і Cu порівняно з ГДК відповідно у 2,7 і 1,8 рази.

Таблиця 1. Концентрація Zn і Cu у вегетативній масі, бджолиному обніжжі та перзі, мг/кг

Досліджуваний матеріал	Поле №1 (контроль)				Поле №2 (дослід)	
	ГДК цинк	Цинк	ГДК мідь	Мідь	Цинк	Мідь
Вегетативна маса	50,0	26,5	3,0	6,2	10,9	3,0
Бджолине обніжжя	10,0	11,0	5,0	5,0	8,1	2,5
Перга	10,0	33,3	5,0	9,7	26,9	9,1

Примітка: ГДК – дані ДСТУ 3127-95 «Обніжжя бджолине. ГУ».

Результати досліджень, відображені на рисунку, показують також певний вплив вапнування кислих ґрунтів на коефіцієнт накопичення Zn і Cu у вегетативній масі гречки, бджолиному обніжжі та перзі.




Рис. 1. Коефіцієнт накопичення Zn і Cu у вегетативній масі гречки, бджолиному обніжжі та перзі.

Аналіз одержаних результатів досліджень показав, що коефіцієнт накопичення Zn у вегетативній масі гречки та перзі за вапнування ґрунтів був нижчий відповідно 1,29 рази і 1,39 рази, а у бджолиному обніжкі навпаки, більше у 1,36 рази, порівняно з аналогічною сировиною, заготовленою із території без внесення вапна. Порівняно з цією картиною спостерігалась і з концентрацією Cu. Так, у вегетативній масі гречки та бджолиному обніжкі та перзі за вапнування ґрунтів коефіцієнт накопичення Cu був нижчий відповідно у 1,54 рази, 2,0 та 1,3 рази, порівняно з такою ж сировиною, яка була одержана з медоносних угідь без вапнування ґрунтів.

Отже, вапнування кислих ґрунтів сприяло зниженню коефіцієнту накопичення Zn і Cu у вегетативній масі гречки, бджолиному обніжкі та перзі. Водночас, негайно відмітити, що найвищий коефіцієнт накопичення спостерігався як по Zn, так і по Cu, у перзі, порівняно менше у бджолиному обніжкі.

Висновки. Вапнування кислих ґрунтів із розрахунку 6 т/га знижує коефіцієнти накопичення у вегетативній масі гречки Zn в 1,29 рази, а Cu – 1,54 рази; у бджолиному обніжкі – Cu у 2,0 рази; перзі – Zn у 1,39 рази, Cu у 1,3 рази та збільшує коефіцієнт накопичення бджолиному обніжкі Zn у 1,36 рази, що було в межах ДР.

Література

1. Власюк П.А. Химические элементы и аминокислоты в жизни растений. Жизнь человека / П.А. Власюк – К.: Наукова думка, 1974. – 218 с.
2. Комісар О.Д. Перга – новий продукт бджільництва / О.Д. Комісар // Пасіка. - 1994. - №1. - С. 26-28.
3. Кононенко В.К. Практикум з основ наукових досліджень у тваринництві / В.К. Кононенко, І. І. Ібатуллін, В. С. Патров. – Київ, 2000. – С. 96
4. Поліщук В.П. Бджільництво / В.П. Поліщук, К.: Вища школа, 2001. – 287 с
5. Прістер Б.С. Довідник для радіологічних служб/ Б.С. Прістер, А.: Нора-Грінт, 1997. – 172 с.

References

1. Vlasiuk P.A. Khymicheskiye elementy i aminokisloty v zhivotny rasteniy, zhivotnikh i cheloveka / P.A. Vlasiuk – K.: Naukova dumka, 1974. – 218 s.
2. Komisar O.D. Perha – novyi produkt bdzhilnytstva / O.D. Komisar // Pasika. - 1994. - №1. - С. 26-28.
3. Kononenko V.K. Praktykum z osnov naukovykh doslidzhen u tvarynnystvi / V.K. Kononenko, I. I. Ibatullin, V. S. Patrov. – Kyiv, 2000. – S. 96
4. Polishchuk V.P. Bdzhilnytstvo /V.P. Polishchuk, K.: Vyshcha shkola, 2001. – 287 s.
5. Prister B.S. Dovidnyk dla radiolohichnykh sluzhb/ B.S. Prister, A.: Nora-Hrint, 1997. – 172 s.

УДК 631.4:631.821[546.47+546.56]638.178.2

ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТКОВАНИЕ ПОЧВЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СНИЖЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПРОДУКТАХ ПЕРЕРАБОТКИ ПЧЕЛАМИ ЦВЕТОЧНОЙ ПЫЛЬЦЫ / Разанов С.Ф., Шевел Е.Е., Марчак Т.В.

Исследования проводили в условиях центральной Лесостепи на территории Винницкой области. Материалом для исследования были вегетативная масса гречки (стебель), пчелиная обножка и перга, произведенные пчелами из цветочной пыльцы этой культуры. Исследовательский материал заготавливали из гречки, высаженной на полях (№ 1 и № 2), pH которых был в пределах 4,7-4,9. В почву поля № 2 было внесено

известъ из расчета 6 т / га.

По известкование почвы, что снизило его кислотность до 7,4, концентрация Zn і Cu была ниже ПДК соответственно в пчелиной обножке в 1,2 и в 2 раза. В перге наблюдается превышение концентрации Zn і Cu по сравнению с ПДК соответственно в 2,7 и 1,8 раза.

Анализ полученных результатов исследований показал, что коэффициент накопления Zn в вегетативной массе гречихи и перге за известкование почв был ниже соответственно в 1,29 раза и 1,39 раза, а в пчелиной обножке наоборот, больше в 1,36 раза по сравнению с аналогичным сырьем, заготовленной с территории без внесения извести. Подобная картина наблюдалась и с концентрацией Cu. Так, в вегетативной массе гречки, пчелиной обножке и перге за известкование почв коэффициент накопления Cu был ниже соответственно в 1,54 раза, 2,0 и 1,3 раза по сравнению с таким же сырьем, полученным из медоносных угодий без известкования почв.

UCC 631.4:631.821[546.47+546.56]638.178.2

IMPACT ON EFFECTIVENESS LIMING OF SOILS REDUCED CONCENTRATIONS OF HEAVY METALS IN PRODUCT PROCESSING BEE POLLEN / Razanov S.F., Shvets V.V., Marchak T.V.

The study was conducted in the central steppes in Vinnitsa. The material for the study were vegetative mass buckwheat (stem), bee pollen and ambrosia produced by bees from pollen of this culture. Research material harvested from buckwheat, sown in two fields (№ 1 and № 2), the pH of which was in the range 4,7-4,9. In soil field number 2 was made with lime rate of 6 t / ha.

By liming the soil, which reduced its pH to 7.4, the concentration of Zn і Cu was below the MCL in accordance with bee pollen in 1.2 and 2 times. In perge exceeding the concentration of Zn і Cu compared with MPC respectively 2.7 and 1.8 times.

Analysis of the results of research showed that the rate of accumulation of Zn in vegetative mass buckwheat and perge by liming soils was lower respectively 1.29 times and 1.39 times, and bee pollen rather more to 1.36 times, compared with the same raw materials harvested from the territory without making lime. A similar pattern was observed with the concentration of Cu. Thus, the vegetative part buckwheat, bee pollen and perge by liming soil Cu accumulation rate was lower at 1.54 times, respectively, 2.0 and 1.3 times, compared with the same raw material, obtained from bee lands without liming of soils.

Рецензент: Чудак Р.А., доктор с.-г. наук, Вінницький національний аграрний університет

