

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Сільське господарство
та лісівництво
№ 17**

Вінниця

2020



Журнал науково-виробничого та
навчального спрямування
"СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО"
"AGRICULTURE AND FORESTRY"
Заснований у 1995 році під назвою
"Вісник Вінницького державного
сільськогосподарського інституту"

У 2010-2014 роках виходив під назвою "Збірник наукових
праць Вінницького національного аграрного університету".
З 2015 року "Сільське господарство та лісівництво"
Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової інформації
№ 21363-11163 Р від 09.06.2015

Головний редактор

кандидат сільськогосподарських наук, доцент **Мазур В.А.**

Заступник головного редактора

кандидат сільськогосподарських наук, доцент **Дідуру І.М.**

Члени редакційної колегії:

доктор сільськогосподарських наук, професор **Яремчук О.С.**

доктор сільськогосподарських наук, доцент **Вдовенко С.А.**

кандидат сільськогосподарських наук, доцент **Телекало Н.В.**

кандидат географічних наук, доцент **Мудрак Г.В.**

кандидат сільськогосподарських наук, ст. викл. **Панцирева Г.В.**

кандидат сільськогосподарських наук, ст. викл. **Паламарчук І.І.**

доктор сільськогосподарських наук, ст. наук. співробітник **Черчель В.Ю.**

доктор сільськогосподарських наук, професор **Полторецький С. П.**

доктор сільськогосподарських наук, професор **Клименко М. О.**

доктор сільськогосподарських наук, ст. наук. співробітник **Москалець В. В.**

Dr. hab, prof.

Sobieralski Krzysztof

Dr. Inż

Jasińska Agnieszka

Dr. hab, prof.

Siwulski Marek

Doctor in Veterinary Medicine **Federico Fracassi**

Видавець: Вінницький національний аграрний університет

Відповідальний секретар – **Мазур О. В.**, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Редагування, корекція й переклад на іноземну мову – **Кравець Р.А.**, доктор
педагогічних наук, доцент.

Комп'ютерна верстка – **Мазур О.В.**

"СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО"**"AGRICULTURE AND FORESTRY"*****Журнал науково-виробничого та навчального спрямування 09'2020 (17)*****ЗМІСТ**

<i>БІОЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ РОСЛИННИЦТВА ТА ЛІСІВНИЦТВА</i>	
МАЗУР В.А., ПАНЦИРЕВА Г.В., КОПИТЧУК Ю.М. ЗБЕРЕЖЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ ЗА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ І НОРМИ ВИСІВУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ	5
<i>РОСЛИННИЦТВО, СУЧASNІЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВITKU</i>	
ДІДУР І.М., ШЕВЧУК В.В., МОСТОВЕНКО В.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ТА ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ РОСТУ ГОРОХУ ОЗИМОГО ЗА ДІЇ МІКРОБНОГО І СТИМУЛЮВАЛЬНОГО ПРЕПАРАТІВ	15
<i>ПАНЦИРЕВА Г.В. СОРТОВІ РЕСУРСИ ЗЕРНОБОВОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ:</i>	
СУЧASNІЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ	30
ШЕВЧУК О.А., ХОДАНИЦЬКА О.О., ВЕРГЕЛІС В.І., ВАТАМАНЮК О.В.	
ОСОБЛИВОСТІ РОСТОВИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН РЕДИСУ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РЕТАРДАНТІВ	42
<i>ПОЛІЩУК М. І. ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ НА</i>	
ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО	51
<i>ПОЛІЩУК М. І., АНТКО Р.А. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ</i>	
ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ	64
ЦІЦЮРА Я.Г., КОВАЛЬЧУК Ю.О. ФОРМУВАННЯ ОЛІЙНОСТІ НАСІННЯ	
РЕДЬКИ ОЛІЙНОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСОВУВАНИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ	74
<i>ЗАХИСТ РОСЛИН</i>	
ПАМУЖАК Н., ШИНКАРУК В., ДІДУР І., МЕЛЬНИК В. АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОЛДОВЫ В УСЛОВИЯХ ЗАПРЕТА ЧАСТИ ПЕСТИЦИДОВ	85
ОКРУШКО С.Є. ОЦІНКА ВПЛИВУ ГЕРБІЦІДІВ ТА ЗЕАСТИМУЛІНУ НА	
ЗАБУР'ЯНЕНІСТЬ ТА УРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ	95
РУДСЬКА Н.О. ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ	
КУКУРУДЗИ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ	106
<i>СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО</i>	
ЖЕМОЙДА В. Л., МАКАРЧУК О.С., СПРЯЖКА Р.О. ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ ЗА ЯКІСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЗЕРНА	120

АХМАД аль-шейх КАДДУР, ЖЕМОЙДА В.Л., МАКАРЧУК О.С., АЛЬХІН В.І. ГЕНЕТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ТА НОВА ГЕНПЛАЗМА – ОСНОВА ІНТРОДУКОВАНОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ

130

КОРМОВИРОБНИЦТВО, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЕТМАН Н.Я., КВІТКО М.Г. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ГІДРОТЕРМІЧНИХ УМОВ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО

143

ВДОВЕНКО С.А., ІВАНОВИЧ О. М., ШВИДКИЙ П. А., ЗАТОЛОЧНИЙ О.В. СОРТОВІ ОСОБЛИВОСТІ КАПУСТИ БРЮССЕЛЬСЬКОЇ ЗА АДАПТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ У ВІДКРИТОМУ ГРУНТІ

156

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА РАЗАНОВ С. Ф. ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

167

РАЗАНОВ С. Ф., РАЗАНОВА А.М. ІНТЕНСИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ РОЗТОРОПШОЮ ПЛЯМИСТОЮ МІДІ В УМОВАХ ПОЛЬОВИХ СІВОЗМІН

177

ТІТАРЕНКО О.М. ВПЛИВ БІОЛОГІЗОВАНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ЗЛАКОВО-БОБОВОМУ РІЗНОТРАВ'Ї

188

ШКАТУЛА Ю. М., ВОТИК В.О. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ НУТУ

195

ВРАДІЙ О.І. ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF USING THE CULINARY PROCESSING OF MUSHROOMS IN ORDER TO REDUCE THE CONCENTRATION OF HEAVY METALS IN THEM

209

ТИНЬКО В.В. ПОЗАКОРЕНЕВІ ПІДЖИВЛЕННЯ, ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО

223

МОСТОВЕНКО В.В. ВИВЧЕННЯ ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН ТА ТРИВАЛОСТІ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ГОРОХУ ОВОЧЕВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ

235

Збірник наукових праць внесено в оновлений перелік наукових фахових видань України
Категорія Б з сільськогосподарських наук під назвою «Сільське господарство та лісівництво»
(підстава: Наказ Міністерства освіти і науки України 17.03.2020 №409).

Адреса редакції: 21008, Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. 46-00-03

Вінницький національний аграрний університет

Електронна адреса: selection@vsau.vin.ua адреса сайту: (<http://forestry.vsau.org/>).

Номер схвалено і рекомендовано до друку рішенням: Редакційної колегії журналу, протокол № 2 від 25.09.2020 року; Вченої ради Вінницького національного аграрного університету, протокол № 4 від 30.10.2020 року.

УДК 504.5:633.2.03
DOI: 10.37128/2707-5826-2020-2-17

**ВПЛИВ БІОЛОГІЗОВАНИХ
СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА
ІНТЕНСИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ
ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У
ЗЛАКОВО-БОБОВОМУ
РІЗНОТРАВ'Ї**

O. M. ТИТАРЕНКО, старший

викладач

*Вінницький національний аграрний
університет*

Вивчено вплив поліпшення природних кормових угідь на інтенсивність накопичення Pb, Cd, Zn та Cu у злаково-бобовому різновиду за внесення в ґрунти органічних добрив та дефекату. Доведено, що високу ефективність зниження свинцю та кадмію у злаково-бобовому різновиду за поліпшення стану природних кормових угідь в зоні локального їх забруднення прослідковувалось за внесення в ґрунт органіки та дефекату. Виявлено також, що зі збільшенням років вегетації злаково-бобової рослинності природних кормових угідь за внесення в ґрунти органічних добрив та дефекату, концентрація в ній свинцю, кадмію, цинку та міді знижувалася.

Ключові слова: свинець, кадмій, цинк, мідь, злаково-бобове різновиду, природні кормові угіддя.

Табл. 2. Літ. 5.

Постановка проблеми. Ефективне аграрне виробництво є основою продовольчої безпеки держави, важливим завданням якої є забезпечення населення продуктами харчування високої якості. Важливою кормовою сировиною для виробництва продукції тваринництва є біорізноманіття природних кормових угідь. Варто зазначити, що в сучасних умовах природні кормові угіддя піддаються антропогенному впливу господарської діяльності, внаслідок чого рослинне біорізноманіття забруднюється різними токсикантами, зокрема, і важкими металами такими як Pb, Cd, Zn та Cu. Надходження цих елементів у надмірній кількості у організм тварин, а згодом і в організм людини через ланцюги живлення, може викликати вкрай негативні наслідки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За результатами досліджень провідних українських вчених, таких як Мазур В.А., Дідур І.М., Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Жеребна Л.О., Якубенко Б.Є. встановлено, що рослинне біорізноманіття природних кормових угідь постійно зазнає певних змін, серед яких домінуючими є синтетичні. На думку Якубенко Б.Є., аналіз геоботанічного обстеження природних кормових угідь Лісостепу України показав, що вони перебувають у незадовільному стані через високе антропогенне навантаження та потребують відновлення.

Постановка завдання. Визначення впливу органічного поліпшення природних лук на інтенсивність накопичення угідь Pb, Cd, Zn, Cu у злаково-бобовому різновиду природних кормових суходільних низинних лук.

Матеріал і методика проведення дослідження. Для забезпечення результатів дослідження застосувались лабораторні методи з визначенням концентрації Pb, Cd, Zn, Cu у ґрунтах та злаково-бобовому різnotрав'ї. Польові методи проводились впродовж 2016-2019 рр. у господарстві «Дзелів» Жмеринського району Вінницької області та СТОВ «Володимир», с. Шершні Тиврівського району Вінницької області.

Виклад основного матеріалу досліджень. В сучасних умовах ведення сільського господарства при техногенному навантаженні мінеральних добрив на ґрунт [1, 2, 5] та з метою відтворення, збереження агробіорізноманіття та реалізації політики щодо забезпечення продовольчої безпеки держави особливо важливу роль відіграє біологічне землеробство, за якого в якості підвищення врожайності широко застосовують органічні добрива, дефекати, зниження РН ґрутового середовища, вирощування бобових та однорічних трав [4].

На сьогодні саме біологічне, органічне, землеробство є найпоширенішим альтернативним методом ведення сільського господарства у розвинутих країнах світу, здатне забезпечити екологічне, соціальне та економічно доцільне виробництво сільськогосподарської продукції і сировини [3].

Враховуючи важливість розвитку органічного сільськогосподарського виробництва на сучасному етапі, очевидно, що для одержання очікуваних екологічних та соціоекономічних ефектів необхідним є системний підхід у розробці та реалізації комплексу заходів, що стимулюватимуть, сприятимуть і регулюватимуть розвиток екологічного землеробства в Україні.

Нині важливими кроками в процесі розвитку органічного аграрного виробництва є: розробка загального плану дій щодо розвитку екологічного землеробства в Україні на період 2019-2024 років; обґрутування стратегії розвитку екологічного землеробства України на період 2019-2024 років; удосконалення й розробка нормативно-правової бази регулювання розвитку органічного сільськогосподарського виробництва; запровадження цілісного механізму регулювання, контролю якості та сертифікації продукції органічного виробництва. Розвиток та удосконалення системи біологічного землеробства є одним із важливих пріоритетів сучасного сільського господарства України. Основні положення технології його ведення є пріоритетними та особливо актуальними у напрямі збереження, відтворення агробіорізноманіття та навколишнього природного середовища.

Результати досліджень з вивчення якості рослинного біорізноманіття (Табл. 1) низинних суходільних лук, використання органіки на фоні внесення дефекату та проведення звичайної оранки показало високу ефективність зниження у злаково-бобовому різnotрав'ї важких металів, зокрема, свинцю і кадмію. Аналіз вмісту рухомих форм важких металів у злаково-бобовому різnotрав'ї нормальних суходолів без їх поліпшення показав, що концентрація свинцю та кадмію була в межах від 3,4 мг/кг до 3,8 мг/кг та від 0,28 мг/кг до 0,3 мг/кг.

Таблиця

Вміст рухомих форм важких металів у злаково-бобовому різnotрав'ї за біологічного землеробства, мг/кг

Агротехнічні заходи	Свинець												Кадмій											
	2017				2018				2019				2017				2018				2019			
	Коефіцієнт небезпеки	Фактична концентрація	Коефіцієнт накопичення	Коефіцієнт небезпеки	Фактична концентрація	Коефіцієнт накопичення	Коефіцієнт небезпеки	Фактична концентрація	Коефіцієнт накопичення	Коефіцієнт небезпеки	Фактична концентрація	Коефіцієнт накопичення	Коефіцієнт небезпеки	Фактична концентрація	Коефіцієнт накопичення	Коефіцієнт небезпеки	Фактична концентрація	Коефіцієнт накопичення	Коефіцієнт небезпеки	Фактична концентрація	Коефіцієнт накопичення	Коефіцієнт небезпеки	Фактична концентрація	
Без поліпшення природних кормових угідь нормальних суходолів	0,74	3,7	0,63	0,68	3,4	0,65	0,76	3,8	0,68	0,93	0,28	1,24	1,0	0,3	1,27	0,9	0,27	1,3						
Оранка звичайна + органічне добриво + дефекат	0,3	1,5	0,54	0,24	1,2	0,6	0,2	1,0	0,61	0,6	0,18	1,09	0,36	0,11	1,05	0,26	0,08	1,0						

Джерело: сформовано на основі власних досліджень

За поліпшення нормальних суходолів (звичайна оранка + органічні добрива + дефекат) вміст свинцю у злаково-бобовому різnotрав'ї був у межах від 1,0 мг/кг до 1,5 мг/кг, а кадмію від 0,8 мг/кг до 0,18 мг/кг. У злаково-бобовому різnotрав'ї (за використання звичайної оранки + органічне добриво + дефекат) вміст свинцю та кадмію першого року вегетації був нижчим у 2,46 рази та 1,55 рази; другого року вегетації у 2,83 рази та третього року вегетації у 3,8 і 3,3 рази порівняно з аналогічним різnotрав'ям без поліпшення.

Водночас необхідно відмітити, що зниження свинцю та кадмію у злаково-бобовому різnotрав'ї спостерігалось уже за першого року вегетації при застосуванні оранки, дефекату та органічних добрив. Коефіцієнт небезпеки свинцю у злаково-бобовій рослинності, вирощеної за внесення органічного добрива та дефекату у ґрунти природних кормових угідь, був нижчий на першому році вегетації у 20,4 рази, другому році вегетації у 2,8 рази та на третьому році вегетації у 3,8 рази, тоді як кадмію у 1,55 рази, 2,7 та у 3,4 рази відповідно за роками досліджень порівняно з травостоєм вирощеним без удобрення. Коефіцієнт накопичення у злаково-бобовій рослинності свинцю і кадмію за внесення органіки та дефекату в природні кормові угіддя був

нижчий відповідно на першому році вегетації у 1,16 і 1,13 рази, на другому році вегетації у 1,08 і 1,2 рази та на третьому році вегетації у 1,11 і 1,3 рази порівняно аналогічним травостоєм вирощеним без підживлення.

Коефіцієнт накопичення цинку і міді у злаково-бобовому різnotрав'ї за поліпшення в природних кормових угіддях (звичайна оранка, внесення органічних добрив та дефекату) буввищий за першого року вегетації відповідно у 1,07 і 1,11 рази, за другого року вегетації у 1,01 і 1,25 рази та третього року вегетації у 1,23 і 1,27 рази порівняно з травостоєм, вирощеним без застосування даних заходів. Тобто, за органічного поліпшення природних кормових угідь на фоні звичайної оранки та внесення дефекату спостерігається висока ефективність зниження концентрації коефіцієнту небезпеки та накопичення свинцю і кадмію у злаково-бобової рослинності, а цинку і міді, навпаки, підвищення. Вміст цинку і міді у злаково-бобовій рослинності в умовах нормальних суходолів (Табл. 2) без їх поліпшення був в межах відповідно від 9,0 мг/кг і від 2,0 мг/кг до 2,4 мг/кг; за кореневого поліпшення (звичайна оранка + органічне добриво + дефекат) вміст у злаково-бобової суміші коливався від 13,5 мг/кг до 14,7 мг/кг по цинку та від 4,0 мг/кг до 5,7

Таблиця 2

**Вміст рухомих форм важких металів (мікроелементів)
у злаково-бобовому різnotрав'ї за біологічного землеробства**

Агротехнічні заходи	Цинк						Мідь											
	2017		2018		2019		2017		2018		2019							
	Коефіцієнт небезпеки	Фактична концентрація	Коефіцієнт накопичення	Коефіцієнт небезпеки	Фактична концентрація	Коефіцієнт накопичення	Коефіцієнт небезпеки	Фактична концентрація	Коефіцієнт накопичення	Коефіцієнт небезпеки	Фактична концентрація	Коефіцієнт накопичення						
Без поліпшення природних кормових угідь нормальних суходолів	0,19	9,7	1,3	0,18	90,2	1,33	0,18	9,0	1,38	0,08	2,4	4,3	0,07	2,2	4,0	0,06	2,0	4,0
Оранка звичайна + органічне добриво + дефекат	0,29	14,7	1,4	0,28	14,0	1,35	0,27	13,5	1,44	0,19	5,7	4,8	0,14	4,2	5,0	0,13	4,0	5,1

Джерело: сформовано на основі власних досліджень

мг/кг по міді. У злаково-бобовому різnotрав'ї за корінного поліпшення (органічні добрива + звичайна оранка + дефекат) природних кормових угідь нормальних суходолів вміст цинку і міді буввищим на перший рік вегетації у 1,5 і 2,3 рази, на другий рік вегетації у 1,5 і 1,9 рази та на третій рік вегетації у 1,5 і 2,0 рази порівняно з травостоєм, вирощеним без застосування даних заходів. Коефіцієнт небезпеки цинку і міді буввищим у злаково-бобовій рослинності при звичайній оранці, із внесенням органіки та дефекату за першого року вегетації відповідно у 1,52 і 2,3 рази, за другого року вегетації у 1,55 і 2,0 рази та третього року вегетації у 1,5 і 2,1 рази порівняно з травостоєм, вирощеним без застосування даних заходів. Коефіцієнт небезпеки свинцю у злаково-бобовій рослинності, вирощеної за внесення органічного добрива та дефекату у ґрунти природніх кормових угідь, був нижчий на першому році вегетації у 20,4 рази, другому році вегетації у 2,8 рази та на третьому році вегетації у 3,8 рази, тоді як кадмію у 1,55 рази, 2,7 та у 3,4 рази відповідно рокам досліджень порівняно з травостоєм, вирощеним без удобрення. Коефіцієнт накопичення у злаково-бобовій рослинності свинцю і кадмію за внесенням органіки та дефекату в природні кормові угіддя був нижчий відповідно на першому році вегетації у 1,16 і 1,13 рази, на другому році вегетації у 1,08 і 1,2 рази та на третьому році вегетації у 1,11 і 1,3 рази порівняно аналогічним травостоєм вирощеним без підживлення. Коефіцієнт накопичення цинку і міді у злаково-бобовому різnotрав'ї за поліпшення природніх кормових угідь (звичайна оранка, внесення органічних добрив та дефекату) буввищий за першого року вегетації відповідно у 1,07 і 1,11 рази, за другого року вегетації у 1,01 і 1,25 рази та третього року вегетації у 1,23 і 1,27 рази порівняно з травостоєм, вирощеним без застосування даних заходів.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Відомо, що якість і безпека продуктів харчування знаходиться в прямій залежності від стану кормової сировини та умов її виробництва. Важливою сировиною для виробництва продуктів тваринництва є рослинність природних кормових угідь, яка характеризується порівняно низькою собівартістю. За органічного поліпшення природних кормових угідь, зокрема, внесення в ґрунти органіки, дефекату на фоні звичайної оранки спостерігається висока ефективність зниження у злаково-бобової рослинності концентрації, коефіцієнту небезпеки та коефіцієнту накопичення свинцю і кадмію, а цинку і міді, навпаки, підвищення.

Список використаної літератури

1. Голубцева Н.И. Накопление тяжелых металлов в почвах. Вестник Моск. Ун-та. М. 1991. Сер. С.10.
2. Жеребна Л. О. Вплив важких металів, що містяться в мінеральних добривах, на якість рослинницької продукції. Агрономія і ґрунтознавство. 2001. Вип. 61. С. 193-197.

3. Кобець М.І. Органічне землеробство в контексті сталого розвитку. Київ. 2004. 22 с.
4. Razanov S.F., Tkachuk O.P., Mazur V.A., Didur I.M. Effect of bean perennial plants growing on soil heavy metal concentration. Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(2), 294-300 doi:10.15421/2018_341
5. Фатєєв А.І. Надходження важких металів до рослин та ефективність добрив на техногенно забруднених ґрунтах. Вісник аграрної науки. 1999. № 2. С. 61-65.

Список використаної літератури у транслітерації /Reference

1. Holubtseva N.Y. (1991). Nakoplenye tiazhelikh metallov v pochvakh. [*The accumulation of heavy metals in soils*]. Vestnyk Mosk. Un-ta – Herald Mosk. University. [in Russian].
2. Zhrebna L. O. (2001). Vplyv vazhkykh metaliv, shcho mistiatsia v mineralnykh dobryvakh, na yakist roslynnyskoi produktsii. [*Influence of heavy metals contained in mineral fertilizers on the quality of plant products*]. Ahrokhimia i gruntoznavstvo – Agrochemistry and soil science. Issue 61. 193-197. [in Ukrainian].
3. Kobets M.I. (2004). Orhanichne zemlerobstvo v konteksti staloho rozvytku [*Organic farming in the context of sustainable development*]. [in Ukrainian].
4. Razanov S.F., Tkachuk O.P., Mazur V.A., Didur I.M. (2018). Effect of bean perennial plants growing on soil heavy metal concentration. Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 294-300. [in English].
5. Fatieiev A.I. (1999). Nadkhodzhennia vazhkykh metaliv do roslyn ta efektyvnist dobryv na tekhnogenno zabrudnenykh gruntakh. [*Inflow of heavy metals to plants and efficiency of fertilizers on man-made contaminated soils*]. Visnyk ahrarnoi nauky – Bulletin of Agricultural Science. № 2. 61-65. [in Ukrainian].

АННОТАЦІЯ

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЗОВАННЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ЗЛАКОВО- БОБОВОМ РАЗНОТРАВЬЕ

Изучено влияние улучшения природных кормовых угодий на интенсивность накопления Pb, Cd, Zn и Cu в злаково-бобовом разнотравье при внесении в почву органических удобрений и дефеката. Доказано, что высокую эффективность снижения свинца и кадмия в злаково-бобовом разнотравье при улучшении состояния природных кормовых угодий в зоне локального их загрязнения, прослеживалось при внесении в почву органики и дефеката. Выявлено также, что с увеличением лет вегетации злаково-бобовой растительности природных кормовых угодий при внесении в почву органических удобрений и дефеката, концентрация в ней свинца, кадмия, цинка и меди снижалась.

Ключевые слова: свинец, кадмий, цинк, медь, злаково-бобовое разнотравье, природные кормовые угодья.

Табл. 2. Лим. 5.

ANNOTATION

INFLUENCE OF BIOLOGIZED FERTILIZER SYSTEMS ON THE INTENSITY OF ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN LEGUME-FORB PLANTS

The influence of improvement of natural forage lands on the intensity of accumulation of Pb, Cd, Zn and Cu in cereal and legume grasses for application of organic fertilizers and defects to the soil has been studied.

It has been proved that the high efficiency of reduction of lead and cadmium in legume-forbs plants for improving the condition of natural forage lands in the area of their local pollution was followed by the introduction of organic matter and defects into the soil. It was also found that with the increase of vegetation years of forbs and legumes of natural fodder lands for the introduction of organic fertilizers and defects, the concentration of lead, cadmium, zinc and copper in it decreased.

As a result of theoretical analysis and experimental research, the level of heavy metal contamination of plant biodiversity of natural forage lands at different man-made loads was studied. The intensity of pollution of plant biodiversity of absolute land, normal land and land of excessive moisture of dry lowland meadows of Vinnytsia Pb, Cd, Zn and Cu in the conditions of different technogenic loading is estimated.

It was found that with a radical improvement of natural forage lands of dry lowland meadows compared to the surface in the conditions of local pollution, a lower intensity of grass accumulation of heavy metals was observed already in the 1st year of vegetation. The analysis of the obtained results allows us to conclude that the vegetation of natural forage lands in the conditions of local pollution of Vinnytsia region can accumulate above the allowable level of cadmium, which is characteristic of dry moisture, relatively lower content of heavy metals. Under the agrochemical impact on natural forage lands there is a certain pollution of their heavy metals, the accumulation of which in the vegetation depended on the system of tillage with the use of organic matter, relatively higher than mineral fertilization with surface tillage.

Key words: lead, cadmium, zinc, copper, grass and legumes, natural forage lands.

Table. 2. Lit. 5.

Інформація про автора

Титаренко Ольга Михайлівна – старший викладач кафедри екології та охорони навколошнього середовища Вінницького національного аграрного університету (21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3).

Титаренко Ольга Михайловна – старший преподаватель кафедры экологии и охраны окружающей среды Винницкого национального аграрного университета (21008, г. Винница, ул. Солнечная, 3).

Titarenko Olga Mykhailivna – Senior Lecturer of the Department of Ecology and Environmental Protection of Vinnytsia National Agrarian University (21008, Vinnitsia, 3, Soniachna St., e-mail: titarenko0309@ukr.net)

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Наукове видання

«СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО»
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 17

Комп'ютерна верстка: О.В. Мазур

Підписано до друку 29.10.2020. Здано до набору 30.10.2020
Гарнітура Times New Roman. Формат 60x84/8. Папір офсетний

Ум. – друк. арк. 15,0
Тираж 100 прим. Зам. №667

Віддруковано
Вінницьким національним аграрним університетом
21008, Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. (0432) 46-00-03
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і
розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 5009 від 10.11.2015